Mode d'emploi du médicament GINKOR FORT

Dans quel cas le médicament GINKOR FORT est-il prescrit ?

C'est un protecteur vasculaire et un veinotonique. Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires. Il a également un effet antalgique.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique :

- des jambes lourdes, douleurs, impatiences et autres troubles pouvant être en rapport avec une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique ;
- des crises d'hémorroïdes.

Présentations du médicament GINKOR FORT
GINKOR FORT : gélule (jaune et vert) ; boîte de 60

Composition du médicament GINKOR FORT

	p gél
Ginkgo biloba, extrait	14 mg
Heptaminol chlorhydrate	300 mg
Troxérutine	300 mg

Substances actives : Ginkgo biloba extrait standardisé, Heptaminol chlorhydrate, Troxérutine
Excipients : Acide silicique, Fer jaune oxyde, Gélatine, Indigotine, Magnésium stéarate, Titane dioxyde

Contre-indications du médicament GINKOR FORT

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- excès d'hormones thyroïdiennes,
- en association aux médicaments de la famille des IMAO non sélectifs.

Attention Des précautions sont nécessaires en cas d'hypertension artérielle.
Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de phlébite chez les malades alités ou plâtrés. Le traitement de l'insuffisance veineuse repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.
Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.
Sportif : ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage.

Interactions du médicament GINKOR FORT avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé aux médicaments de la famille des IMAO non sélectifs : risque d'hypertension artérielle grave.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Mode d'emploi et posologie du médicament GINKOR FORT

Ce médicament est pris de préférence pendant les repas.
Posologie usuelle :
Jambes lourdes et autres troubles liés à une insuffisance veineuse : 1 gélule, matin et soir.
Crises d'hémorroïdes : 3 ou 4 gélules par jour, pendant 7 jours.

Conseils

Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et lymphatique.
La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

Effets indésirables possibles du médicament GINKOR FORT

Très rarement : troubles digestifs (douleur abdominale, nausées, diarrhées), maux de tête, urticaire, démangeaisons, éruption cutanée.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.